































































































После этой процедуры вводится слабительное (растительного происхождения, синтетические средства или солевые растворы).

При отсутствии антидота следует немедленно и неоднократно обильно промыть желудок водой с 20–30 г активированного угля или белковой водой, затем дать молоко (около 1 л), взбитый с водой яичный белок и, наконец, слабительное. Необходимо полоскать рот водным раствором бертолетовой соли или 5-процентным раствором хлорида цинка. Пострадавшему необходим полный покой.

### *3.12 Хранение ртути*

Хранение ртути, используемой в промышленных целях, производится в стальных баллонах, в количестве не более 35 кг в каждом, а также в толстостенных керамических или стеклянных баллонах емкостью 300 мл с металлической гофрированной пробкой с прокладкой из пластмассы, в каждый из которых заливается 5 кг ртути.

В лабораторных условиях ртуть хранится в толстостенной стеклянной посуде с притертыми пробками на вакуумной смазке. Однако основным способом хранения является хранение в запаянных стеклянных ампулах по 30–40 мл в каждой, которые, в свою очередь, помещаются в сварные стальные коробки.

Не разрешается хранить ртуть в тонкостенной посуде, а также в любой открытой посуде.

### **Список литературы**

1 Безопасность жизнедеятельности. Ч. 1. Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях / В. П. Бубнов [и др.], отв. ред. В. П. Бубнов. – Минск : АМАП, 2013. – 535 с.